

# VIÐVÖRUNAR- MERKI UM KRABBAMEIN Í BÖRNUM

## CHILDHOOD CANCER WARNING SIGNS



Fölví, óeðlilegir marblettir eða blæðing, beinverkir.

Pallor, bruising or bleeding, general bone pain.



Bólger eða fyriferð – sérstaklega ef verkjalausar, með hitaleysi og engum vísbendingum um sýkingu.

Lumps or swelling – especially if painless and without fever or other signs of infection.



Óútskýrt þyngdartap eða hiti, þrálátur hósti eða andstytta, nætursviti.

Unexplained weight loss or fever, persistent cough or shortness of breath, sweating at night.



Breytingar á augum – hvítur blettur í auga, barnið verður allt í einu rangeygj, blinda, mar eða bólga í kringum augu.

Eye changes – white pupil, new onset squint, visual loss, bruising or swelling around the eyes.



Bólga eða fyriferð í kvið.

Abdominal swelling.



Höfuðverkir, sérstaklega ef óvanalega þrálátir eða miklir, uppköst (sérstaklega að morgni dags eða ef þau aukast á nokkrum dögum).

Headaches, especially if unusually persistent or severe, vomiting (especially early morning or worsening over days).



Verkir í útlínum eða beinverkir, bólga án þekkts áverka eða vísbendinga um sýkingu.

Limb or bone pain, swelling without trauma or signs of infection.



## LÁTIÐ SKOÐA BETUR EF ÞESSI EINKENNI ERU TIL STAÐAR

IF THESE SYMPTOMS ARE  
PRESENT REFER FOR  
FURTHER EXAMINATION